

国内で接種可能な新型コロナワクチン\_小児

(作成：2025年9月現在)

※**毎年度10月1日～翌年3月31日の間で各市町村が設定する期間に1回**、65歳以上 および 規定の基礎疾患を有する60～64歳の方を対象とした**定期予防接種が実施されています**。定期予防接種制度に基づく接種以外は、任意接種 としての取り扱いとなります。

本表は現時点で国内において接種可能なワクチンの概要を一覧として整理したものです。個別のワクチンの詳細は各製造販売業者提供資料ならびに添付文書をご参照ください。

| 製造販売業者   | 小児（5（6）～11歳）  |  |   |   | 乳幼児（6か月～4歳）   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|
|  | ファイザー   | モデルナ   | 第一三共  | 武田薬品  | ファイザー   | モデルナ  |
| 販売名  | コミナティRTU筋注5～11歳用<br>1人用<br><b>（ライトブルーキャップ）</b>                                    | スパイクボックス筋注シリンジ<br>6か月～11歳用<br><b>プレフィルドシリンジ</b>  | ダイチロナ筋注<br><b>（イエローキャップ）</b>  | ヌバキノピッド筋注 1mL<br><b>（ピンクキャップ）</b>   | コミナティ筋注<br>6か月～4歳用3人用<br><b>（イエローキャップ）</b>  | スパイクボックス筋注シリンジ<br>6か月～11歳用<br><b>プレフィルドシリンジ</b>   |
| 製剤写真<br>（各社ホームページより）                             |  |          |  |  |                          |    |
| 種類   | mRNAワクチン  | mRNAワクチン   | mRNAワクチン  | 組換えタンパクワクチン<br>（アジュバントを含む）  | mRNAワクチン  | mRNAワクチン  |
| 任意接種対象年齢   | <b>5～11 歳</b>   | <b>5～11 歳</b>  | <b>5～11 歳</b>   | <b>6～11 歳</b>   | <b>6か月～4歳</b>   | <b>6か月～4歳</b>   |
| 接種不適当者<br>（添付文書記載 一般的共通事項（注釈※1）ほか）               | —   | —  | —   | —   | —   | —   |
| 接種方法   | 筋肉内投与   |  |   |   |   |   |
| 1回接種量  | <b>希釈なし 0.3 mL</b>  | <b>希釈なし 0.25 mL</b>  | <b>希釈なし 0.2 mL</b>  | <b>希釈なし 0.5 mL</b>  | <b>希釈後 0.3 mL</b>   | <b>希釈なし 0.25 mL</b>   |
| 希釈に使用する生理食塩水量                                    | —   | —  | —   | —   | <b>1.1 mL</b>   | —   |
| 1バイアルの含有量  | 1回分   | 1回分  | 4回分   | 2回分   | <b>3回分</b>  | 1回分   |
| 1回接種量中の有効成分量<br>（mRNAワクチン参考）                     | 10 µg   | 25 µg  | 20 µg   | SARS-CoV-2<br>組換えスパイク蛋白質(rS)抗原<br>5 µg  | 3 µg  | 25 µg   |
| 適応   |   |  |   |   |   |   |
| 初回免疫／過去に新型コロナワクチンの接種歴がない者への接種                    | ○   | ○  | ○   | ○   | ○ ※2  | ○ ※2  |
| 「初回免疫」 接種回数                                      | —   | —  | —   | 2回  | <b>3回</b>   | 2回  |
| 初回免疫／<br>過去に新型コロナワクチンの接種歴がない者への接種<br>における接種間隔（*） | 4週間<br><br>（過去に新型コロナワクチンの接種歴のない者にはおよそ4週間の間隔をおいて2回目接種を行うことができる）                    |  |   | <b>3週間</b>  | 2回目:1回目から <b>3週間</b><br>3回目:2回目から少なくとも <b>8週間</b><br>経過した後  | 4週間   |
| 上記接種間隔（*）を超えて<br>接種間隔が空いた場合の対応                   | —   |  |   | 1回目の接種から上記の標準の<br>接種間隔を超えた場合は、<br>できるだけ早期に2回目を接種                                    | 各回の接種から上記の<br>接種間隔を超えた場合は、<br>できるだけ速やかに次回を接種  | 各回の接種から上記の<br>接種間隔を超えた場合は、<br>できるだけ速やかに次回を接種  |
| 追加免疫   | ○   | ○  | ○   | —   | ○   | ○   |
| 「追加免疫」における接種間隔                                   | 前回接種終了後<br><b>3か月</b> 以上経過後   | 前回接種終了後<br><b>3か月</b> 以上経過後  | 前回接種終了後<br><b>3か月</b> 以上経過後   | —   | 前回接種終了後<br><b>3か月</b> 以上経過後   | 前回接種終了後<br><b>3か月</b> 以上経過後   |
| 他のワクチンとの同時接種                                     | 医師が必要と認めた場合には、他のワクチンとの同時接種可能（作成日現在） ※3  |  |   |   |   |   |
| 他のワクチンとの接種間隔                                     | 他のワクチンとの接種間隔を問わない（作成日現在） ※3   |  |   |   |   |   |
| 備考   | <b>希釈なし</b> 、接種量 0.3 mL/ 回  | ・ 医療機関納入時の温度管理条件と保存期間に留意<br>・ 接種前に <b>外箱の赤地に白字</b> で「6か月～11歳用」との記載を確認（「12歳以上用」は外箱の青地に白字記載） | —   | 対象年齢が6歳以上、初回免疫のみ適応であることに留意（作成日現在）   | <b>1.1 mL</b> で希釈、接種量 <b>0.3 mL</b> / 回・3回接種<br><br>接種部位：三角筋中央部又は大腿前外側部<br>※1歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種する。臀部には接種しないこと | 接種部位：三角筋中央部又は大腿前外側部<br>※1歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種する。臀部には接種しないこと<br>・ 医療機関納入時の温度管理条件と保存期間に留意<br>・ 接種前に <b>外箱の赤地に白字</b> で「6か月～11歳用」との記載を確認（「12歳以上用」は外箱の青地に白字記載） |

注 各ワクチンの詳細は各製造販売業者提供資料ならびに添付文書をご参照ください。

※1 接種不適当者 一般的共通事項 1 明らかな発熱を呈している者 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 3 本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者 4 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

※2 モデルナ社新型コロナワクチンの接種を受けた生後6か月以上4歳以下の者、及び、ファイザー社6か月～4歳用新型コロナワクチンの接種を受けた生後6か月以上4歳以下の者については、

それぞれのワクチンの初回免疫における接種回数が異なることから、2回目又は3回目に1回目又は2回目接種したもの異なる新型コロナワクチンを接種することはできない。

※3 新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔に関して、生ワクチン以外のワクチンと同様の取り扱い（＝接種間隔の制限なし）に変更（2024年2月5日開催 第55回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会にて決定）。